PATENT COOPERATION TREATY

V.0	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark
(PCT Rule 61.2)	Office 4 Box PCT
	Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing (day/month/year) 04 April 2000 (04.04.00)	in its capacity as elected Office
International application No. PCT/JP99/04249	Applicant's or agent's file reference S-13-PCT
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
04 August 1999 (04.08.99)	05 August 1998 (05.08.98)
Applicant	
NAGANO, Tomokazu et al	
The designated Office is hereby notified of its election ma	de:
□	
X in the demand filed with the International Prelimina	
03 March 200	00 (03.03.00)
in a notice effecting later election filed with the Inte	rnational Bureau on
In a notice effecting fater election filed with the lifter	mational soreau on.
2. The election X was	
was not	
made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under
*	
	Authorized officer
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	R. Forax
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference S-13-PCT	FOR FURTHER AC		onofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date	e (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP99/04249	04 August 199	9 (04.08.99)	05 August 1998 (05.08.98)
International Patent Classification (IPC) or n A61K 38/18, A61P 9/10	national classification and	I IPC	RECEIVED
			MAR 2 9 2001
Applicant SUMI	ТОМО РНАКМАС	CUETICALS CO.,	LTD. TECH CENTER 1600/2900
This international preliminary examinated and is transmitted to the applicant action.	ination report has been p ecording to Article 36.	repared by this Intern	ational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	sheets,	including this cover s	neet.
This report is also accompare been amended and are the base Rule 70.16 and Section 607 of	sis for this report and/or	sheets containing rec	ption, claims and/or drawings which have tifications made before this Authority (see CT).
These annexes consist of a to	tal ofsl	heets.	
3. This report contains indications rela	ting to the following iten	ns:	
l Basis of the report			
II Priority			
III Non-establishment o	of opinion with regard to	novelty, inventive ste	p and industrial applicability
IV Lack of unity of inve	ention		}
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with ations supporting such st	regard to novelty, invatement	ventive step or industrial applicability;
VI Certain documents o	cited		
VII Certain defects in th	e international application	on	
VIII Certain observations	s on the international app	olication	
Date of submission of the demand		Date of completion o	f this report
03 March 2000 (03.03	3.00)	02 No	vember 2000 (02.11.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	



International application No.

PCT/JP99/04249

I.	Basis	of the re	report	
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	\boxtimes	the inte	nternational application as originally filed	
		the des	escription:	
		pages	s,	as originally filed
		pages	, file	d with the demand
		pages		
		the clai	laims:	
	_	pages	s,	as originally filed
		pages		
		pages	C1-	d with the demand
		pages		,
		the dra	rawings:	
	_	pages	5	, as originally filed
		pages	C1	d with the demand
		pages		
	\Box	he seaue	uence listing part of the description:	
				, as originally filed
		pages		
		pages		
2.	the ir	nternation e elemen the lan the lan	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the ional application was filed, unless otherwise indicated under this item. ents were available or furnished to this Authority in the following language anguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). anguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). anguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under 8.3).	which is:
3.	With	regard	d to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, examination was carried out on the basis of the sequence listing:	the international
	Ц	contair	ained in the international application in written form.	
	Щ	filed to	together with the international application in computer readable form.	
	Щ	furnish	shed subsequently to this Authority in written form.	
	Щ		shed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the national application as filed has been furnished.	disclosure in the
			statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written se furnished.	quence listing has
4.		The an	amendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
			the claims, Nos.	
ĺ			the drawings, sheets/fig	
5.			report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been at the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	n considered to go
	De-1	•	1	11 and notamed to
*	in th	acement : is report 70.17).	at sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amenda	nents (Rule 70.16
**	Any r	eplacem	ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	



International application No.

PCT/JP99/04249

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
1. Statement			
Novelty (N)	Claims		YES
	Claims	1-15	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-15	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1 [Takahiro Yamaguchi et al., "Examination of efficacy of using hepatocyte growth factor together with laser surgery for regenerating deficient cardiac muscle in the treatment of chronic ischemic disease," Japanese Circulation Journal, Vol. 62, Supplement I, Feb. 1998, p. 407, P089], document 2 [JP, 7-300426, A (Snow Brand Milk Products Co., Ltd.) 14 November 1995 (14.11.95) & WO, 95/29694, A1 & EP, 784980, A1 & US, 5840311, A], Claims; Par. Nos. 0008, 0009, and 0013, document 3 [JP, 8-295634, A (Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd.) 12 November 1996 (12.11.96) Claims; Par. No. 0014 (Family: none)], document 4 [JP, 5-97694, A (Denki Kagaku Kogyo Ltd.) 20 April 1993 (20.04.93) Claim 3; Par. Nos. 0010, 0036 (Family: none)], document 5 [WO, 93/03061, A1 (Toray Industries Inc.) 18 February 1993 (18.02.93) & EP, 550769, A1]] Claims; page 29, line 19 to page 30, line 3, and document 6 [JP, 6-340546, A (Toshikazu Nakamura) 13 December 1994 (13.12.94) & WO, 93/08821, A1 & EP, 724884, A1] Claims; Par. No. 0012 cited in the international search report describe pharmaceutical products that have hepatic growth factor (HGF) as the active ingredient and that distribute an effective amount of this growth factor to tissues at a local site of administration and their surrounding tissues. Documents 1-3 further state that the pharmaceutical products are used especially for the treatment of ischemic diseases of the heart and limbs, and for arterial disease. Therefore, the subject matter of Claims 1-15 does not appear to be novel.



T., 4	Notice No.	
International App	oncation No.	
		•
International Fili	ng Date	
International Fili	ng Date	

REQUEST	International Filing Date
The undersigned requests that the present	
international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.	Name of receiving Office and "PCT International Application"
	Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum) S-13-PCT
Box No. 1 TITLE OF INVENTION	19
PREPARATIONS FOR ADMINISTRATION	OF HEPATOCYTE GROWTH FACTOR
Box No. II APPLICANT	
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal code and name of cou address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country of residence is indicated below.)	legal entity, full official miry. The country of the o) of residence if no State This person is also inventor.
Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd	Telephone No.
2-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku	, Osaka-
shi, Osaka 541-8510 Japan	Teleprinter No.
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:
JAPAN This person is applicant all designated all	JAPAN d States except
for the purposes of: States V the United St	ates of America of America only the Supplemental Box
Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURT)	
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal code and name of couladdress indicated in this Box is the applicant's State (that is, country, of residence is indicated below.)) of residence if no State
NAGANO Tomokazu	applicant only Ty applicant and inventor
c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co.	🖎
1-98, Kasugadenaka 3-chome, Konol Osaka-shi, Osaka 554-0022 Japan	nana-ku, is marked, do not fill in below.)
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN
	ates of America U the United States the States indicated in the Supplemental Box
V Further applicants and/or (further) inventors are indicated or	
Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE;	OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
The person identified below is hereby/has been appointed to act of of the applicant(s) before the competent International Authorities	
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal co	de and name of country.) 06-6315-8021
8548 Patent Attorney HIROSE Takay	Voshi Facsimile No.
Takahashi Bldg. Kita-sangokan 6th 13-3, Nishitenma 5-chome, Kita-ku	
Osaka 530-0047 Japan	Teleprinter No.
Address for correspondence: Mark this check-box where n	o agent or common representative is/has been appointed and the

Sheet No. ...2

Continuation of Box No. III FULL HER APPLICANT(S) A	AND/OR (FURTHER) IN-ENTOR(S)			
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.				
Name and address: (Family name followed by given name; for a ladesignation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) KUDO Ikue c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 11, Kanda-surugadai 3-chome, Chiy Tokyo 101-8319 Japan	This person is: applicant only			
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN			
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated the United States all designated the United States	States except attes of America			
Name and address: (Family name followed by given name; for a led designation. The address must include postal code and name of count address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) KAWAMURA Takao c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 1-98, Kasugadenaka 3-chome, Konoha Osaka-shi, Osaka 554-0022 Japan	applicant only Ltd.,			
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN			
This person is applicant all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a le designation. The address must include postal code and name of count address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) TAIJI Mutsuo c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 1-98, Kasugadenaka 3-chome, Konoha Osaka-shi, Osaka 554-0022 Japan	applicant only U applicant and inventor			
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN			
This person is applicant for the purposes of: all designated the United States				
Name and address: (Family name followed by given name; for a led designation. The address must include postal code and name of count address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) to of residence is indicated below.) NOGUCHI Hiroshi c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 11, Kanda-surugadai 3-chome, Chiyo Tokyo 101-8319 Japan	This person is: applicant only Ltd., The country of the of residence if no State This person is: applicant only			
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN			
This person is applicant all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the Supplemental Box			
V Further applicants and/or (further) inventors are indicated on	another continuation sheet.			

Continuation of Box No. III FU LER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) IN ENTOR(S)					
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.					
Name and address: (Family name followed by given name; for a lassignation. The address must include postal code and name of count address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country, of residence is indicated below.)	egal entity, full official nry. The country of the tof residence if no State This person is:				
TANI Shunsuke	applicant only				
c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 2-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8510 Japan					
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN				
This person is applicant all designated for the purposes of:	States except tes of America				
Name and address: (Family name followed by given name; for a ladesignation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) MAEDA Hiroo c/o Sumitomo Pharmaceuticals Co., 3-45, Kurakakiuchi 1-chome, Ibaral Osaka 567-0878 Japan	applicant only Ltd., V applicant and inventor				
State (that is, country) of nationality: JAPAN	State (that is, country) of residence: JAPAN				
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated the United States the United States	States except es of America				
Name and address: (Family name followed by given name; for a le designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	regal entity, full official by. The country of the of residence if no State This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)				
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:				
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated the United States	States except the United States the States indicated in the sof America only the Supplemental Box				
Name and address: (Family name followed by given name; for a le designation. The address must include postal code and name of coun address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	try. The country of the				
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:				
This person is applicant all designated for the purposes of: all designated States all designated the United Sta					
Further applicants and/or (further) inventors are indicated on	another continuation sheet.				

Box 1	No.V	DESIGNATION OF ATES			
The f	ollow	ing designations are hereby made under Rule 4.9(a)	mark	the app	licable check-boxes; at least one must be marked):
		atent		• •	
			121	esotho	, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland,
		UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State	which	is a C	Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT
h zzi	EA	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan Moldova, RU Russian Federation, TJ Tajikistan, T of the Eurasian Patent Convention and of the PCT	, ВҮ ГМ Т	Belan urkme	us, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of nistan, and any other State which is a Contracting State
ಠಶ	EP	DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB	Unite	d King	itzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, gdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, y other State which is a Contracting State of the European
Ⅵ	OA	GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML M any other State which is a member State of OAPI ar	lali, M nd a C	R Mai	Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, uritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and ting State of the PCT (if other kind of protection or treatment
Nation	ıal Pate	ent (if other kind of protection or treatment desired, specify			
℧		United Arab Emirates	_		
			7		Liberia
		Albania	团	LS	Lesotho
		Armenia	∇	LT	Lithuania
M		Austria	∇	LU	Luxembourg
M	ΑU	Australia	∇	$\mathbf{L}\mathbf{V}$	Latvia
՛️ 🏒 .	ΑZ	Azerbaijan	∇	MD	Republic of Moldova
∇	BA	Bosnia and Herzegovina	· 🔽		Madagascar
∇	BB	Barbados	∇		The former Yugoslav Republic of Macedonia
∇	BG	Bulgaria			
∇	BR	Brazil	7	MN	Mongolia
\[\sqrt{2}\]	BY	Belarus			3
\Box	CA	Canada	[J]		Malawi
Ū		and LI Switzerland and Liechtenstein	团		Mexico
		China			Norway
<u> </u>		Cuba	\Box		New Zealand
[<u>V</u>]			∇	PL	Poland
		Czech Republic	∇	PT	Portugal
		Germany	∇	RO	Romania
V		Denmark	∇	RU	Russian Federation
V	EE	Estonia	∇	SD	Sudan
V	ES	Spain	∇	SE	Sweden
∇	FI	Finland	∇	SG	Singapore
∇	GB	United Kingdom	∇	SI	Slovenia
\square	GD	Grenada	V		Slovakia
\square	GE	Georgia	Ŋ		Sierra Leone
∇	GH	Ghana	<u> </u>	TJ	Tajikistan
[7]		Gambia		TM	
<u> </u>		Croatia			
$\overline{\square}$		Hungary		TR	Turkey
<u>V</u>	ID	Indonesia	\(\overline{\sqrt{2}}\)	TT	Trinidad and Tobago
<u>[7</u>			V	UA	Ukraine
	IL	Israel	. V	UG	Uganda
	IN	India	∇	US	United States of America
∇	IS	Iceland			
<u>V</u>	JP	Japan	垃	UZ	Üzbekistan
\square	KE	Kenya	V	VN	Viet Nam
\square	KG	Kyrgyzstan	$\overline{\square}$	YU	Yugoslavia
	KP	Democratic People's Republic of Korea	ΙΏΙ	ZA	South Africa
_			∇	ZW	Zimbabwe
₹Z	KR	Republic of Korea			
<u> </u>		Kazakhstan	bec	ome pa	xes reserved for designating States which have irty to the PCT after issuance of this sheet:
<u> </u>		Saint Lucia	_	-	
			닏		
V	LL	Sri Lanka	Ŀ		, ,

Precautionary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying that designation and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)

Sheet No. ...5...

Box No. VI PRIORITY CI	LAI	Further price	ority c. are indicated	in the Supplemental Box.
Filing date	Number		Where earlier applicat	
of earlier application (day/month/year)	of earlier application	on national application:	regional application:*	international application:
	Tananasa Dat	country	regional Office	receiving Office
item (1)	Japanese Pate Application N	No.		
05. 08. 98	10/222170	JAPAN	ļ	
item (2)	Japanese Pate	ent		
13. 01. 99	Application N 11/6261	JAPAN		
item (3)	11/0201		,	
The receiving Office is requ	uested to prepare and t	transmit to the International Bu	reau a certified conv	
of the earlier application(s) purposes of the present inte) (only if the earlier a ernational application	application was filed with the a state is the receiving Office) identifi	Office which for the ed above as item(s):	
* Where the earlier application is a Convention for the Protection of Inc	ın ARIPO application, it dustrial Property for whi	is mandatory to indicate in the Su ch that earlier application was file	pplemental Box at least on d (Rule 4 10(h)(ii)) See Su	e country party to the Paris
	NAL SEARCHING	***	1.	- pptemental Box.
Choice of International Search	ing Authority (ISA)	Request to use results of ear	lier search; reference	to that search (if an earlier
(if two or more International Season competent to carry out the interna	itional search, indicate	search has been carried out by or	requested from the Internat	tional Searching Authority):
the Authority chosen; the two-letter of	ode may be used) :	Date (day/month/year)	Number	Country (or regional Office)
ISA / JP				
Box No. VIII CHECK LIST:				
This international application co the following number of sheets		tional application is accompan	ied by the item(s) marke	ed below:
1	1. [<u>V</u>] fee ca	alculation sheet		
description (excluding	-	rate signed power of attorney		
sequence listing part) : 24		of general power of attorney;		y:
	. [ment explaining lack of signatu		
I		ity document(s) identified in B	. ,	
sequence listing part		lation of international application		
,)	rate indications concerning dep	•	•
Total number of sheets: 39		cotide and/or amino acid sequer	ice usung in computer r	eadable form
Figure of the drawings which should accompany the abstract:	, , , , , , , oo.	Language of filing of the		
Box No. IX SIGNATURE C	DE A DDI ICANTE OD	international application:		
Next to each signature, indicate the nam		·	s (if such canacity is not obvio	ous from reading the request)
<i>J</i>			o (9, 00000 oopaan) 12 110, 00 110	in from reading the requesty.
	Takayosni R	Hirose (seal)		
		-		
1. Date of actual receipt of the		or receiving Office use only -		2 Dec
international application:	parported		• w	2. Drawings:
Corrected date of actual receitimely received papers or drather purported international approach.	wings completing			received:
Date of timely receipt of the corrections under PCT Articl	required le 11(2):			not received:
International Searching Author (if two or more are competent	ority t): ISA /		l of search copy delayed n fee is paid.	
	For I	International Bureau use only		
Date of receipt of the record cop by the International Bureau:	y	·		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04249

				-
	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁶ A61K38/18			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification a	nd IPC	
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum do Int.	cumentation searched (classification system followed b C1 ⁶ A61K38/18	y classification syml	pols)	
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such docu	nments are included i	n the fields searched
	ata base consulted during the international search (name US (STN)	of data base and, wh	nere practicable, sear	ch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app			Relevant to claim No.
X	Takahiro Yamaguchi et al., "Examing Hepatocyte Growth Factor, together for reproducing defected parts for treatment of chronic ischemed Circulation Journal, Feb 1998, p.407, P089	er with laser of cardiac m ic diseases"	operations uscles, , Japanese	1-15
х	JP, 7-300426, A (Snow Brand Mil 14 November, 1995 (14.11.95), Claims; [0008], [0009], [0013] & WO, 95/29694, Al & EP, 78498 & US, 5840311, A		Co., Ltd.),	1-15
х	JP, 8-295634, A (Sumitomo Pharm 12 November, 1996 (12.11.96), Claim; [0011], (family: none)	aceuticals (Co., Ltd.),	1-15
X Y	JP, 5-97694, A (Denki Kagaku Ko 20 April, 1993 (20.04.93), Claims; [0003], [0010], [0036],		íne)	1-8,11,12,15 9,10,13,14
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent far	nily annex.	
"A" docume consider earlier date "L" docume cited to special "O" docume means "P" documenthan the documenthan the consideration of the consideration of the constant of the co	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is a establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed actual completion of the international search November, 1999 (08.11.99)	"X" document of paconsidered now step when the considered to it combined with combination be document mem	principle or theory und articular relevance; the call or cannot be conside document is taken alone articular relevance; the call or the	ne application but cited to erlying the invention cellaimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be p when the document is a documents, such a skilled in the art family
	nailing address of the ISA/	Authorized officer		
Japa Facsimile N	anese Patent Office	Telephone No.		



International application No.

PCT/JP99/04249

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Delevere
X	WO, 93/03061, Al (Toray Industries Inc.)	Relevant to claim No
Y	18 February, 1993 (18.02.93)	1-8,11,12,15 9,10,13,14
	Claim; page 29, line 19 to page 30, line 3	-, -0, 13, 14
	& EP, 550769, A1	
X	JP, 6-340546, A (toshikazu Nakamura),	1-8,11,12,15
Y	13 December, 1994 (13.12.94) Claim; [0012]	9,10,13,14
	& WO, 93/08821, A1 & EP, 724884, A1	×
Y	Van BELLE, Eric et al, Potentiated Angiogenic Effect of	
•	Scatter Factor/Hepatocyte Growth Factor via Induction of Vascular Endothelial Growth Factor, Circulation, May 1998, Vol. 97, No. 4, pp. 381-390, Abstract, Discussion	9,10,13,14
		•
:		
	•	
	·	
	·	
	·	

PCT

世界知的所有権機関 国際 事務局 特許:--力条約に基づいて公開された 三際出願



(51) 国際特許分類6 A61K 38/18

A1

(11) 国際公開番号

WO00/07615

(43) 国際公開日

2000年2月17日(17.02.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/04249

(22) 国際出願日

1999年8月4日(04.08.99)

(30) 優先権データ

特願平10/222170 特願平11/6261

1998年8月5日(05.08.98) 1999年1月13日(13.01.99)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

住友製薬株式会社

(SUMITOMO PHARMACEUTICALS CO., LTD.)[JP/JP]

〒541-8510 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番8号 Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ)

永野智一(NAGANO, Tomokazu)[JP/JP]

河村敬夫(KAWAMURA, Takao)[JP/JP]

泰地睦夫(TAIJI, Mutsuo)[JP/JP]

〒554-0022 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98号

住友製薬株式会社内 Osaka, (JP)

宮東育枝(KUDO, Ikue)[JP/JP]

野口 浩(NOGUCHI, Hiroshi)[JP/JP]

〒101-8319 東京都千代田区神田駿河台3丁目11番地

住友製薬株式会社内 Tokyo, (JP)

谷 俊輔(TANI, Shunsuke)[JP/JP]

〒541-8510 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番8号

住友製薬株式会社内 Osaka, (JP)

前田弘雄(MAEDA, Hiroo)[JP/JP]

〒567-0878 大阪府茨木市蔵垣内1丁目3番45号

住友製薬株式会社内 Osaka, (JP)

(74) 代理人

JP

弁理士 廣瀬孝美(HIROSE, Takayoshi)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目13番3号

高橋ビル北3号館6階 Osaka、(JP)

(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: PREPARATIONS FOR THE ADMINISTRATION OF HEPATOCYTE GROWTH FACTOR

(54)発明の名称 肝実質細胞増殖因子投与用製剤

(57) Abstract

Preparations to be administered for treating or preventing ischemic diseases or arterial diseases which contain hepatocyte growth factor (HGF) as the active ingredient. Compared with intravenous administration, these preparations are advantageous in that the HGF concentration can be maintained at the affected part to which HGF has been administered and thus the half-life can be prolonged and the administration dose can be reduced; and they exert the effect almost exclusively on the affected part.

(57)要約

肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分として含有し、虚血性疾患あるいは動脈 疾患を治療又は予防するための投与用製剤。

静脈内投与と比較してHGFが投与された患部のHGF濃度が維持され半減期が長く、投与量が低減でき、また患部以外への作用が少ないという効果を有する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

料 エートトライ・ス アファルー・ア デア・リジへ をニアア・リン・ア をニアア・リン・ア をニアア・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・リン・ア アフ・アン・ア アン アン アン アン アン アン アン アン アン ア	DEEFFGGGGGGGGHHILLLJKKKKKKKKKKEFFGGGGGGGGHHILLLJKKKKKKKKKKKKEFFGGGGGGGGHHILLLJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK	KCLLLCLLL MMの MMの MMの MMの MMの MMの MMの MMの MMの	RSSSSSSTTTTTTTTUUUVYZZ RSSSSSSSTTTTTTTTUUUVYZZ アグェガッグラガシーゴキャクタトトトウナメラナーリブ アグェガッグラガシーゴキャクコニラン アグェガッグラガシーゴキャクコニラン アグェガッグラガシーゴキャクコニラン アグェガックコエネフィージンルルリクガ国ズイーアン アンロエステトタタトトトウウ米ウヴュ南ジ アンフィージンルルリクガ国ズイーアン アンフィーアン アンマーアン
DE デイン DK デンマーク			•

特許協力条約




PCT

国際予備審査報告

REC'D 17 NOV 2000
WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 S-13-PCT	今後の手続きについては、		ちの送付通知(様式) ら)を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP99/04249 国際出願日 (日.月.年) 04.08.99 優先日 (日.月.年) 05.08.98						
国際特許分類(IPC) Int. Cl ⁷	国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ A61K38/18, A61P9/10					
出願人(氏名又は名称)	E友製薬株式会	社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの国				逆い送付する。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙	属書類、つまり補正されて、 明細書、請求の範囲及び/ご 実施細則第607号参照)	 この報告の基礎	きとされた及び/又に	はこの国際予備審		
3. この国際予備審査報告は、次の内容 I X 国際予備審査報告の基礎	を含む。					
	Ⅱ					
	Lの利用可能性についての国	際予備審査報告の	の不作成			
IV M 発明の単一性の欠如						
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 VI ある種の引用文献	る新規性、進歩性又は産業」	-の利用可能性に	こついての見解、それ	いを裏付けるため		
VII 国際出願の不備						
VII 国際出願に対する意見				9		
			-			
国際予備審査の請求書を受理した日 03.03.00	国際子備	指審査報告を作成 02.1	した日 1.00			
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	沖 百	F査官(権限のあ [下	る職員) 1-1101 内網	4C 9284		



国際出願番号 PCT/JP99/04249

I.	F	国際予備審查報	告の基礎	14,				
1.	F		こ提出された記				(PCT14条) の規定に とし、本報告書には添付し	
•	X	出願時の国際	出願書類		. ,			
		明細審 明細審 明細審	第 第 第		_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出され 国際予備審査の部	れたもの 育求審と共に提出されたも 付の書簡と共に提	
		請求の範囲	第 第 第				れたもの 現定に基づき補正されたも 財求書と共に提出されたも 付の書簡と共に提	Ø
		図面 図面 図面	第 第 第 第		_ページ/図、 _ページ/図、 _ページ/図、 _ページ/図、	国際予備審査の請		Ø
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	表の部分 第		_ページ、 _ページ、 _ページ、	出願時に提出され 国際予備審査の請	れたもの 対求書と共に提出されたも 付の書簡と共に提	
2.		上記の書類は、 国際調査の PCT規則	下記の言語で のために提出 則48.3(b)にい	である されたPCT規貝 ハう国際公開の言	語であ 則23.1(b)にい 語	- •		
3.		この国際とこの国際とこの国際とこの国際後に、出願後に、出願後にはまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	出願に含まれ出願と共に提っての国際予定の国際予定との国際予定との方と書面である。	る書面による配列 出されたフレキシ 備審査(または調 備審査(または調 による配列表が出	刊表 ンブルディスク 関査) 機関に提 関査) 機関に提 出願時における	/による配列表 是出された 書 面による 是出されたフレキシス 国際出願の開示の	基づき国際予備審査報告 る配列表 ブルディスクによる配列表 範囲を超える事項を含まな こ記録した配列が同一であ	そい旨の陳述
4.	補 	請求の範囲			_ _項	ジ/図		
5.		れるので、そ	の補正がされ	補充欄に示した。 いなかったものと こ考慮しなければ、	して作成した。	(PCT規則70.2(示の範囲を越えてされた c) この補正を含む差し ⁵	ものと認めら 替え用紙は上



国際出願番号 PCT/JP99/04249

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解		-		·
	新規性(N)	請求の範囲	-	-2	有
		請求の範囲 _	1-15	5	無
	進歩性(IS)	請求の範囲 _			有
		請求の範囲 _	1-15	· ·	無
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-15	· 5	有
		請求の範囲 _			無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲 1 — 1 5 は、文献 1 (山口 高広 等、「慢性虚血心筋に対するレーザー心筋内欠陥新生術におけるHepatocyte Growth Factor併用効果の検討」、Japanese Circulation Journal, Feb 1998, Vol. 62, Supplement I, p. 407, P089)、文献 2 (JP, 7-300426, A (雪印乳業株式会社) 14. 11月. 1995 (14. 11. 95) &WO, 95/29694, A1&EP, 784980, A1 &US, 5840311, A) の特許請求の範囲、【0008】、【0009】、【0009】、【0013】、文献 3 (JP, 8-295634, A (住友製薬株式会社) 12. 1月. 1996 (12. 11. 96) ファミリーなし)の特許請求の範囲、【0014】、文献 4 (JP, 5-97694, A (電気化学工業株式会社) 20. 4月. 1993 (20. 04. 93) ファミリーなし)の【請求項3】、【0010】、【0036】、文献 5 (WO, 93/03061, A1 (東レ株式会社) 18. 2月. 1993 (18. 02. 1993) &EP, 550769, A1)の請求の範囲、第29ページ第19行一第30ページ第3行、文献 6 (JP, 6-340546, A (中村 敏一) 13. 12月. 1994 (13. 12. 94) &WO, 93/08821, A1&EP, 724884, A1)の特許請求の範囲、【0012】に、肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分とし、投与部位局所のとい、分析に、文献 1-3には、心臓又は四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療するためのものが記載されているから、新規性を有しない。

EP



国際調査報告



(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

· •				
出願人又は代理人 の書類記号 S-13-PCT	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP99/04249	国際出願日 (日.月.年) 04.08.99	優先日 (日.月.年) 05.08.98		
出願人(氏名又は名称)	住友製薬株式会社			
· ·				

出願人(氏名又は名称) 住友製薬株式会社
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。
この国際調査報告は、全部で3ページである。
□ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった。
■ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。
2. □ 請求の範囲の一部の調査ができない(第 I 欄参照)。
3. ② 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。
4. 発明の名称は 🗵 出願人が提出したものを承認する。
次に示すように国際調査機関が作成した。
·
5. 要約は 区 出願人が提出したものを承認する。
第Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ の国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第 図とする。
□ 出願人は図を示さなかった。
□ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

		<u>.</u>	
•	国際語	国際出版 PCT/JP9	9/04249
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. C	1 6 A 6 1 K 3 8 / 1 8		
B. 調査を行			
調査を行った最	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C	1 6 A 6 1 K 3 8 / 1 8		
最小限資料以外	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	·		
	•		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、 間	調査に使用した用語)	,
CAPIII	S (STN)	·	
0111 20			•
C 照浦士 2	ると認められる文献		
引用文献の	2 C 86 07 54 0 3 X RA		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	山口 高広 等、「慢性虚血心筋に対 術におけるHepatocyte Growth Factor Circulation Journal, Feb 1998, Vol. P089	併用効果の検討」、Japanese	1-15
X	JP, 7-300426, A (雪印乳 1995 (14.11.95) 特許請 【0009】、【0013】 &WO, 95/29694, A1&E &US, 5840311, A	求の範囲・【0008】	1-15
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国際出願	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表されて出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの	発明の原理又は理
「L」優先権 日若しく 文献(3	公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す)	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考: 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
	よる開示、使用、展示等に言及する文献 踊り前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願。	ようて進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	S D W

国際調査機関の名称及びあて先

国際調査を完了した日

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 国際調査報告の発送日

16.11.99



4C 9284

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

08.11.99

C(続き).	関連すると認められる文献	883±3 =
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	JP, 8-295634, A (住友製薬株式会社) 12.11月. 1996 (12.11.96) 特許請求の範囲、【0011】 ファミリーなし	1-15
X Y	JP, 5-97694, A(電気化学工業株式会社)20.4月. 1993(20.04.93)【請求項3】、【0010】、 【0036】 ファミリーなし	1-8, 11, 12, 15 9, 10, 13, 14
X Y	WO, 93/03061, A1 (東レ株式会社) 18. 2月. 1993 (18. 02. 93) 請求の範囲、第29ページ第19行 -第30ページ第3行 &EP, 550769, A1	1-8, 11, 12, 15 9, 10, 13, 14
X Y	JP, 6-340546, A (中村 敏一) 13. 12月. 1994 (13. 12. 94) 特許請求の範囲、【0012】 &WO, 93/08821, A1&EP, 724884, A1	1-8, 11, 12, 19 9, 10, 13, 14
Y	Van BELLE, Eric et al, Potentiated Angiogenic Effect of Scatter Factor/Hepatocyte Growth Factor via Induction of Vascular Endothelial Growth Factor, Circulation, May 1998, Vol. 97, No. 4, pp. 381-390, Abstract, Discussion	9, 10, 13, 14
		· .

明細書

肝実質細胞増殖因子投与用製剤

5 技術分野

本発明は、肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分として含有し、虚血性疾患又は動脈疾患を治療又は予防するための投与用製剤に関する。さらに詳しくは、心臓または四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療又は予防するために、患部及びその周辺の筋肉局所部位に投与することからなる筋肉内投与用製剤などに関する。

10

背景技術

肝実質細胞増殖因子(HGF)は成熟肝細胞に対する強力な増殖促進因子として発 見され、その遺伝子クローニングがなされたタンパク質である(Biochem B iophys Res Commun, 122, 1450 (1984), Proc. 15 Natl. Acad. Sci. USA, 83, 6489, (1986) , FEBS Letter, 22, 231 (1987), Nature, 342, 440 (198 9), Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87, 3200 (1991))。その後の研究により、HGFはin vivoにおいて肝再生因子として障害 肝の修復再生に働くだけでなく、血管新生作用を有し、虚血性疾患や動脈疾患の治療 または予防に大きな役割を果たしていることが明らかとなってきた(Symp.So 20 c. Exp. Biol., 47 cell behavior, 227-234 (19) 93), Proc. Natl. Acad. Sci., 90, 1937-1941 (1 993), Circulation, 97, 381-390 (1998))。すなわ ち、ウサギの下肢虚血モデルにおいてHGFを投与すると、顕著な血管新生が見られ 血流量の改善、血圧減少の抑制、虚血症状の改善が生じたとの報告がなされている。 25 これらの報告により、今日では、血管新生因子の一つとしてHGFが発現、機能して いると考えられるようになった。

5

10

15

20

25

このようにHGFは血管新生因子の機能を始めとして種々の機能を持っており、医薬品として活用するための色々な試みがなされてきた。しかし、ここで問題となってきたのがHGFの血中での半減期である。HGFの半減期は約10分と短く、血中濃度を維持することが困難であり、また、HGF有効量の患部への移行性が問題となった。

一般的にタンパク性製剤の場合は静脈内への投与の多いことが常識となっており、前記虚血性疾患モデルに対するHGFの投与に関しても、例えば静脈や動脈内への投与の例が示されている(Circulation, 97, 381-390(1998))。このような動物モデルに対する静脈あるいは動脈内投与により、虚血性疾患あるいは動脈疾患に対するHGFの有効性が明らかにされているものの、具体的なHGFの有効な投与方法あるいは投与量等については、未だ結論が出されていない。特にHGFの場合は、前記のような半減期の問題、患部への移行性の問題もあり、HGFの有効な投与法あるいは投与量等については、未だ結論が出されていない。

本発明は、HGFを有効成分として含有し、虚血性疾患または動脈疾患を治療又は 予防するための投与用製剤を提供することを目的とする。さらに詳しくは、心臓又は 四肢の虚血性疾患又は動脈疾患を治療又は予防するために、患部及びその周辺の筋肉 局所部位に投与することからなる筋肉内投与用製剤などに関する。本発明の筋肉内投 与用製剤は、例えば障害部位である心臓、四肢の虚血部位の筋肉内に直接投与される ものであり、投与されたHGFの利用効率が極めて高く、静脈内投与と比較して投与 量が低減できる。さらに、投与部位である筋肉から、血液中、投与部位の筋肉組織及 びその周辺の組織を除いた全身への移行、分布、作用が少ないため、他の部位への作 用を軽減でき、より選択性の高いものであるという効果を有する。

本発明者らはHGFを虚血性疾患あるいは動脈疾患に適応するにあたり、投与量、 投与法の検討を鋭意行ってきた。上記疾患に対するHGFの投与法として、静脈内ボ ーラス投与、静脈内持続投与、皮下投与、腹腔内投与、筋肉内投与などの方法を想定 して検討を行ってきた。

前記したように、一般的にタンパク性製剤の場合は静脈内投与の多いことが常識と

5

なっており、加えて、虚血性疾患及び動脈疾患は血管傷害であることから、血管の内側から薬剤を効かせるのが効果的であるとの常識があった。それゆえ、虚血性疾患モデルや動脈疾患モデルに対するHGFの投与についても、静脈あるいは動脈内への投与の例がほとんどであり、HGFの筋肉内への投与については文献も含めて情報が無く、またHGFの体内動態についても報告を見出すことができなかった。このように、虚血性疾患モデルや動脈疾患モデルに対してHGFの筋肉内投与を試みた報告はなされておらず、従ってHGFの筋肉内投与が有効であるか否かについては、今まで全く明らかにされていなかった。

本発明者らはラットを用いて、下肢虚血部位に対する筋肉内投与の体内動態と、他 の投与経路(静脈内投与)の体内動態とを比較検討した。その結果、筋肉内投与の場合には、静脈内投与した場合と比較し、投与したHGFが投与部位で非常に高い濃度 で維持され、血清中及び肝臓や腎臓への移行の低いことが明らかとなった。また、H GFを皮下投与した場合にも、筋肉内投与と同様に投与部位でのHGF濃度が高く維持され、投与部位から循環血中への移行率は低いものであった。

- 15 一方、HGFを静脈内投与した場合には、血中のHGF濃度が高く維持されるのに対して、筋肉内におけるHGF濃度は極端に低いことが見出された。このことから、虚血患部及びその周辺の筋肉又はそこに存在する血管にHGFを作用させようとした場合には、静脈内投与では効率が悪く、患部もしくはその周辺の筋肉内に直接投与することが有効であることを、初めて明らかにした。
- 20 また、HGFの筋肉内投与と静脈内ボーラス投与とを比較したところ、筋肉内投与では、血液、肝臓及び腎臓における最大濃度が静脈内ボーラス投与の場合の100分の1以下、より好適には1000分の1以下となることを見出した。さらに、筋肉内投与では、投与部位の筋肉組織内濃度が静脈内ボーラス投与の場合の50倍以上、より好適には200倍以上となることが見出された。
- 25 さらに、血液、肝臓及び腎臓におけるAUCを筋肉内投与と静脈内ボーラス投与とで比較したところ、筋肉内投与では、血液、肝臓及び腎臓におけるAUCが静脈内ボーラス投与の5分の1以下、より好適には10分の1以下となることを見出した。さ

らに、投与部位の筋肉組織内AUCは、筋肉内投与では、静脈内ボーラス投与の50倍以上、より好適には200倍以上となることが見出された。

以上のように筋肉内投与により、患部の投与部位にHGFが高濃度で維持されることが分かったため、次に、筋肉組織内のHGFが患部の組織や血管に移行して、HGFとしての作用を本当に果たしているか否かを調べた。すなわち、HGFのリセプターである c-Me t のリン酸化が見られるか否かを指標としてHGFの機能を確認した。その結果、30~3000 μ g/k gのHGFをラット筋肉内に投与した場合、筋肉組織ではHGFの受容体である c-Me t のTy r 残基がリン酸化を受け、活性化されていたが、肝臓や腎臓組織では、無処置群と比し、c-Me t は全く活性化されていないことが明らかとなった。このことは、投与した筋肉組織においてHGFはその作用を発揮し、肝臓や腎臓においては作用を示さないことを意味している。

5

10

15

25

以上のようにHGFの作用が確認されたため、本発明者らは実際にHGFの筋肉内投与による有効性を調べるために、閉塞性動脈硬化症(ASO)の動物モデルを用いて検討を行った。即ち、ラット下肢虚血モデルを用いて前記筋肉内投与を行った場合、下肢の虚血障害がどのように改善されるかを検討した。検討方法として、下肢の皮膚表面温度をサーモグラフィーを用いて測定し、皮膚表面温度の低下抑制を指標に筋肉内投与の効果を確認した。その結果、この筋肉内投与により虚血下肢における皮膚表面温度の低下が抑制されることを見出した。これは、HGFが持つ血管新生作用により、虚血下肢の血行動態が改善され温度の低下が抑制されたことを示している。

20 以上のように、ASOモデルに対するHGFの筋肉内投与の有効性が、初めて明らかとなった。

さらに本発明者らは、ラット下肢虚血ASOモデル及びウサギ下肢虚血ASOモデルを用いて前記筋肉内投与を行い、I/N比(%)(虚血肢血圧/正常肢血圧×100)を調べた。その結果、低投与量・低投与頻度で、I/N比の有意な改善が認められた。これは、HGFが持つ血管新生作用により、虚血肢の血行動態が改善したことを示している。さらに、ウサギモデルについては血管造影も行ったところ、HGF投与群のほうが有意に血管造影スコアの増加率が高かった。これはすなわち、HGFの

5

20

25

作用により側副血行路の発達が促進されたことを示している。また虚血肢関節の硬化度、虚血肢爪先の壊死・脱落および虚血肢下腿部の潰瘍の有無についても併せて調べたところ、HGFの筋肉内投与により改善する傾向が認められた。

PCT/JP99/04249

以上のように、虚血性疾患に対するHGFの筋肉内投与が極めて有効であることが明らかとなった。

上記の実験結果のうち、サーモグラフィーを用いて有効性が確認できたことは、臨床のASO患者、特に軽症の段階から自覚症状として虚血下肢の冷感を持つ患者に対してもHGFの筋肉内投与が有効であることを意味しており、加えてI/N比や血管造影の回復促進、さらには虚血肢の症状の軽減などの改善効果も確認できたことは、初期のASO患者から、重症なASO患者までこのHGFの筋肉内投与による治療が有効であることを示すものである。このことは、虚血による下肢の切断等が必要になる重症なASOに進行する前に、軽症の段階でASOの治療が出来ることを可能にするものであり、従って本発明の筋肉内投与用製剤は、現在有効な治療方法がまだない大勢の軽症のASO患者にとって、病状の進行を抑制、改善・回復できるという画期的な治療法を提供することができる。しかも、低投与量で効果を示し、また静脈内投与と比較して患部以外への作用の少ない医薬を提供することができる。

なお、上記のようなHGFの効果をさらに発揮させるためには、コンドロイチン硫酸などの細胞外基質を構成するプロテオグリカン及びそれらを成分として含む蛋白キャリアーを含有しないHGF製剤が望ましいことも明らかとなった。即ち、コラーゲンを基質として作製したミニペレットからのHGFの放出に対するコンドロイチン硫酸配合の影響を検討したところ、コンドロイチン硫酸を配合したHGF含有ミニペレットでは、コンドロイチン硫酸を配合せずアラニンを配合したHGF含有ミニペレットと比較し、ミニペレットからのHGFの放出が速いという結果が得られた。このことは、コンドロイチン硫酸などの細胞外基質を構成するプロテオグリカンを配合しないHGF製剤の方が、HGFの放出が遅いことを示している。このことは上記のように、コンドロイチン硫酸などの細胞外基質を構成するプロテオグリカンを含有しないHGF製剤の方が、投与局所の組織において保持され易く、血液を介する全身の他の

臓器への移行、分布を抑えることができることを意味している。

発明の開示

15

本発明は、以上のような知見に基づいてなされたものである。すなわち本発明は、

- 5 (1) HGFを有効成分とし、投与部位局所の組織及びその近傍組織に有効量の該 因子を移行・分布・作用させ、且つ、投与部位以外の血液中及び全身の組織への移行 ・分布・作用を低減できる製剤、
 - (2) 虚血性疾患又は動脈疾患を治療又は予防するための、前記(1)記載の製剤、
 - (3) 投与部位が筋肉である、前記(1)又は(2)記載の筋肉内投与用製剤、
- 10 (4) 投与部位が皮下又は表皮である、前記(1)又は(2)記載の皮下投与用製剤、外用剤又はハップ剤、
 - (5) 投与部位が骨格筋又は心筋である、前記(3)記載の筋肉内投与用製剤、
 - (6) 投与部位である筋肉組織への移行・分布・作用が、血液、肝臓及び腎臓への移行・分布・作用を凌駕することを特徴とする、前記(1)、(2)、(3)又は(5)記載の製剤、
 - (7) HGFを有効成分として含有する製剤の同量を静脈内へボーラス投与した時と比較し、血液、肝臓及び腎臓における最大濃度が100分の1以下であり、投与部位である筋肉組織内濃度が50倍以上であることを特徴とする、前記(1)、(2)、(3)、(5)又は(6)記載の筋肉内投与用製剤、
- 20 (8) HGFを有効成分として含有する製剤の同量を静脈内へボーラス投与した時と比較し、血液、肝臓及び腎臓におけるAUCが5分の1以下であり、投与部位である筋肉組織内AUCが50倍以上であることを特徴とする、前記(1)、(2)、(3)、(5)又は(6)記載の筋肉内投与用製剤、
- (9) 心臓または四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療又は予防するための、前25 記(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)又は(8)記載の筋肉内投与用製剤、
 - (10) 心臓または四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療又は予防するための投

与部位が患部及びその周辺の筋肉局所である、前記(9)記載の筋肉内投与用製剤、

- (11) 1回の投与量が $0.01\sim500\mu$ g/kgであることを特徴とする、前記(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9) 又は(10) 記載の筋肉内投与用製剤、
- 5 (12) 1回の投与量が0.1~10μg/kgであることを特徴とする、前記(11)記載の筋肉内投与用製剤、
 - (13) 動脈疾患が閉塞性動脈硬化症である、前記(1)~(12)いずれか記載の製剤、
- (14) 虚血性疾患が虚血性心疾患である、前記(1)~(12)いずれか記載の 10 製剤、並びに
 - (15) HGFを有効成分として含有し、且つ、HGFを結合・吸着する物質を含有しないことを特徴とする、前記(1)~(14)いずれか記載の製剤、に関する。

15 図面の簡単な説明

図1は、ラット大腿後部筋肉内にHGFを投与した後の筋肉中濃度推移を示す図である。

図2は、ラット大腿部筋肉内にHGFを投与した後の血清中の濃度推移を示す図である。

20 図3は、ラット大腿部筋肉内にHGFを投与した後の肝臓中の濃度推移を示す図である。

図4は、ラット大腿部筋肉内にHGFを投与した後の腎臓中の濃度推移を示す図である。

図5は、ラット下肢虚血モデルの皮膚表面温度に対するHGFの改善効果を示すグ 25 ラフである。

図6は、HGF含有コラーゲンミニペレットからのHGFの放出を示す図である。 図7は、ラット大腿部筋肉内にHGFを投与した後の筋肉、肝臓、腎臓におけるc 5

20

-Metのリン酸化を示す図である。

図8は、ラット下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与し、I/N比(%)(虚血肢血圧/正常肢血圧×100)を調べた結果を示す図である。

図9は、ウサギ下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与し、下肢血圧の I/N比の推移を調べた結果を示す図である。

図10は、ウサギ下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与し、下肢血圧のI/N比の増加率を調べた結果を示す図である。

図11は、ウサギ下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与し、血管造影スコアの増加率を調べた結果を示す図である。

10 図12は、ラット下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与(1 μ g/k g×2回投与)し、I/N比を調べた結果を示す図である。

図13は、ラット下肢虚血ASOモデルに対してHGFを筋肉内投与(3 μ g/kg×単回投与)し、I/N比を調べた結果を示す図である。

15 発明を実施するための最良の形態

本発明で使用されるHGFは公知物質であり、医薬として使用できる程度に精製されたものであれば、種々の方法で調製されたものを用いることができ、また既に市販されている製品(例えば、東洋紡株式会社、CodeNo.HGF-101等)を使用してもよい。HGFの製造法としては、例えば、HGFを産生する初代培養細胞や株化細胞を培養し、培養上清等から分離、精製して該HGFを得ることができる。あるいは遺伝子工学的手法によりHGFをコードする遺伝子を適切なベクターに組み込み、これを適当な宿主に挿入して形質転換し、この形質転換体の培養上清から目的とする組換えHGFを得ることができる(例えば Nature、342、440(1989)、日本特開平5-111383号公報、Biochem. Biophys.

25 Res. Commun. 163, 967 (1989) など参照)。上記の宿主細胞は特に限定されず、従来から遺伝子工学的手法で用いられている各種の宿主細胞、例えば大腸菌、酵母又は動物細胞などを用いることができる。このようにして得られたH

GFは、天然型HGFと実質的に同じ作用を有する限り、そのアミノ酸配列中の1若しくは複数のアミノ酸が置換、欠失及び/又は付加されていてもよく、また同様に糖鎖が置換、欠失及び/又は付加されていてもよい。

本発明のHGF含有製剤は、投与部位局所の組織及びその近傍組織に有効量の該因子を移行・分布・作用させ、且つ、投与部位以外の血液中及び全身の組織への移行・分布・作用を低減できることを特徴とする。

5

10

15

20

25

具体的な適用疾患としては、例えば虚血性疾患あるいは動脈疾患といった、現在までにHGFの薬効が確認されている全ての循環器系の疾患が挙げられる。すなわち心疾患としては、虚血性心疾患、心筋梗塞、急性心筋梗塞、心筋症、狭心症、不安定狭心症、冠動脈硬化、心不全などが挙げられ、四肢虚血性疾患としては、閉塞性動脈硬化症、バージャー病、血管損傷、動脈塞栓症、動脈血栓症、臓器動脈閉塞、動脈瘤などが挙げられる。

投与方法としては、前記の如く投与部位局所の組織及びその近傍組織に有効量のH GFを移行・分布・作用させ、且つ投与部位以外の血液中及び全身の組織への移行・ 分布・作用を低減できる投与方法であれば如何なる投与方法であっても良い。具体的 には、筋肉(骨格筋、心筋)内投与、皮下もしくは表皮への投与が挙げられる。投与 形態としては、例えば、注射用水性剤もしくは油性剤、軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、エアロゾル剤、ハップ剤などが挙げられる。さらに、徐放性のミニペレット 製剤を調製し患部近くに埋め込むこと、あるいはオスモチックポンプなどを用いて患 部に連続的に徐々に投与することなども可能である。これらの製剤は、従来公知の技 術を用いて調製され、有効成分であるHGFに対し、必要に応じてpH調整剤、緩衝 剤、安定化剤、保存剤、あるいは可溶化剤等を添加しても良い。

その際、本発明のHGF含有製剤は、HGFに結合・吸着する物質を含有しない製剤であることが好ましい。すなわち、本発明において初めて提示したコンドロイチン硫酸などの細胞外基質の構成成分を配合しないHGF製剤は、配合したものと比較して、投与部位からのHGFの放出が遅いという特徴を有する。従って投与局所から血中、他の臓器への大量の移行を抑えることができる。さらに、コンドロイチン硫酸と

同じく細胞外基質の構成成分であるへパリンを配合することにより血中クリアランスの抑制されることが知られているが(Hepatology、20、417(1994)、本発明の製剤は細胞外基質の構成成分を含有しないものであるため、血中に移行したHGFのクリアランスを抑制しない。従って他の臓器への移行性、反応性をさらに抑制し、投与部位である筋肉における有効性を高めることができると考えられる。

5

10

15

20

25

ここでHGFを吸着・結合する物質としては、例えば、細胞外基質(マトリックス)の構成成分である糖、糖蛋白、糖脂質、複合糖質などが挙げられる。より具体的には、コンドロイチン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ヘパリン様物質などが挙げられる。硫酸基などを含む糖、糖蛋白、糖脂質、複合糖質など、HGFに結合・吸着する物質も同様である。また、生体構成成分に限定されず、上記、糖、糖蛋白、糖脂質、複合糖質の一部分を含むことにより、HGFに吸着・結合する物質も同様である。さらに、HGFを吸着・結合する物質としては、蛋白製剤に使用される蛋白質、糖蛋白質などの蛋白キャリアーまたはそれらに含有されるHGFに結合・吸着する物質も含まれる。HGFを吸着・結合する物質として、蛋白キャリアーに微量に含有されるHGFに結合・吸着する物質もこの範疇に含まれる。以上のようなHGFに結合・吸着する物質を含有しないものが、本発明のHGF含有製剤として好ましい。

また、蛋白製剤において、pHやイオン強度、イオン濃度などの条件、あるいは化 学修飾などにより、タンパク質の重合の割合などの物性が異なることが知られている。 この様なタンパク質の物性の違いも、筋肉などの投与した組織における本発明の投与 用製剤の保持、血中への移行性に影響すると考えられる。

後述の実施例に示したように、本発明の投与用製剤は、投与量の少ないことをも特徴とする。投与量としては、患者の症状、年齢、性別等によって異なるが、例えば成人患者の患部またはその周辺に筋肉内投与する場合、以下の投与量が挙げられる。

すなわち、1)本実施例において $1 \mu g / k g$ の投与量で有効性が確認されている点、2)本実施例にて有効性が確認されたラットの投与量(体重当たり)を体表面積当たりの投与量に換算し、ヒト有効投与量を推定すると $0 2 \mu g / k g$ 程度と考え

られる点、および3)当業者の技術常識、等を勘案すれば、本発明の製剤の投与量と しては、少なくとも 500μ g/kg/回以下、より具体的には $0.01\sim500\mu$ g/kg/回、好ましくは $0.1\sim10\mu g/kg/回程度が挙げられる。また投与$ 期間・投与頻度としては、長くとも3ヶ月以内の投与期間で週1~2回の投与頻度が 挙げられ、好ましくは1週間以内の投与期間で週7回以下の投与頻度が挙げられる。 さらに好ましくは、1週間以内の投与期間で1回または2回の投与頻度が挙げられる。 本発明の投与用製剤を適用する患者における投与部位の特定及び投与方法としては、 以下のものが挙げられる。例えば、閉塞性動脈硬化症の虚血肢の診断においては、安 静時疼痛、間歇性跛行、潰瘍の有無、トレッドミルを用いた歩行可能な距離の測定、 10 ドップラー血流計等を用いたAnkle Pressure Index (下肢血圧と上腕血圧の比)の 測定を行い、虚血肢、虚血領域を推定する。造影剤を用いた血管造影(Angiography)、 Digital Subtraction Angiography, Magnetic Resonance Angiographyなどにより、血 管の狭窄、閉塞部位を詳しく特定する。肢の状態の判定に関しては、例えば、Society for Vascular Surgery/ North American Chapter and International Society for C ardiovascular Surgery により推奨された標準書などに従う。血管造影などにより特 15 定された虚血部位の筋肉及びその周辺の筋肉に対し、本発明の投与製剤を、その領域 の大きさに応じて1ケ所から20ケ所、好ましくは3ケ所から6ヶ所に分けて投与す る。

さらに本発明の筋肉内投与用製剤は、前記治療目的の他、予防のためにも使用する 20 ことができる。

実施例

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により なんら限定されるものではない。

25 実施例 1

投与経路によるHGFの体内動態の比較

1. 筋肉内投与によるHGFの体内動態の検討

(1)方法

5

10

15

25

フィッシャー系ラット用いて、HGFを0.3、1、<math>3mg/kgで筋肉内投与し た場合と、6、600 μ g/kg/hrで3時間静脈内持続投与した場合の血 清、肝臓、腎臓、筋肉(投与部および対側)中HGF濃度を測定した。筋肉内投与は、 エーテル麻酔下で、ラットの左大腿後部筋肉の中央部に行った。投与容量は1ml/ kgとし、0.3M NaCl, 0.03% Tween80, 5mg/ml Lalanineを含む10mMクエン酸緩衝液(pH5.5)をvehicleとし て用いた。HGF投与から5分、30分、2時間、8時間、24時間経過後、ラット から血清、肝左側葉、腎臓、筋肉(投与部および対側)を得た。静脈内持続投与はラ ットの尾静脈から行い、投与速度は0.07ml/hrとした。投与開始から3時間 以上経過後に、同様に血清、肝左側葉、腎臓、筋肉を得た。血清中および各臓器中の ヒトHGF濃度については、ヒトHGF測定用ELISAキットであるイムニスHG F EIA(特殊免疫研究所製)を用いて測定した。臓器中のHGFは、2M Na Cl、lmM PMSF、lmM EDTA、0.1% Tween80を含有する2 0 mM Tris-HCl (pH 7.5)を抽出液として用い(筋肉:12ml/g tissue、肝臓・腎臓: 8 ml/g tissue)、1分間ホモジナイズし た後、4°、15,000rpmで60分間遠心分離し、抽出液中のHGF量を上述 のELISAキットにて測定した。その際、スタンダード溶液についても、HGFを 投与していないラットの臓器に既知濃度のHGFを添加し、同様に抽出した溶液を用 ・いた。また、サンプルの希釈液についても、HGFを投与していないラットの臓器の 抽出液を同様に調製して用いた。濃度推移の解析にはモーメント解析法を用いた。

(2)結果

HGFを大腿部筋肉内に投与した後の筋肉におけるHGF濃度の推移について、図 1に示す。HGFを尾静脈内へ持続投与した後の結果についても、併せて図1に示す。HGFを尾静脈から6、60 μ g/k g/h r で 3 時間持続投与したときの筋肉中濃度については測定限界(1.5 n g/g t is sue)以下であった。3 m g/k g で筋肉内投与した場合の筋肉中における薬物動態パラメータを表1に示した。投与

5

10

15

表1

投与経路、投与量	筋肉内投与、3mg/	kg
筋肉部位	投与部	対側
AUC(hr·ng/g tissue) (infinite)	11.6 x 10 ⁵	820
t1/2(hr)	10. 6	11. 2
Cmax(ng/g tissue)	84. 1 x 10 ³	82. 4
Tmax	5min	5min

なお、表1において、対側とは、反対側の投与部位に対応する部位である。即ち、 本例では、左大腿後部筋肉に投与しているので、その反対側である右大腿後部筋肉で ある。

以上の図1および表1に示されるように、HGFを筋肉内投与した場合、投与した筋肉内で非常に高い濃度を示した。これらは、HGFが薬効を示すために十分すぎる濃度であると考えられた。一方、対側の筋肉内においては、投与部の約1/1000の濃度に留まった。図2に示されるように、HGFを筋肉内に投与した場合、血清中のHGF濃度は比較的低く推移し、投与部筋肉内から循環血中への移行率は6.7%と低かった。また、図3、4に示されるように、HGFを筋肉内投与した場合、肝臓、腎臓中のHGF濃度は静脈内投与した場合と比較して、極端に低かった。 HGFを静脈内へ持続投与した後の血清中、肝臓、腎臓のHGF濃度の結果についても、併せて図2、3、4に示す。

HGFを静脈内に持続投与した場合、血清、肝臓、腎臓中のHGF濃度が高く持続

されるのに対し、筋肉内におけるHGF濃度は極端に低かった。最高投与量である6 00μ g/kg/hr群を例に取ると、血清中では536ng/mlのHGFが存在していたのに対し、筋肉中では10ng/g tissue未満しか存在しなかった。このことから、虚血筋肉患部及びその周辺の筋肉又はそこに存在する血管に選択的にHGFを作用させる事を目的とした場合、静脈内投与では効率が悪く、局所筋肉内に直接投与する方が有効であると考えられた。また、HGFを筋肉内に投与する事により、他の部位には作用させずに、筋肉組織に選択的にHGFを作用させる事ができ得ると考えられた。

2. 投与経路によるHGF血中濃度推移の比較

10 (1)方法

フィッシャー系ラット用いて、HGFを3mg/kgで筋肉内投与した場合と、0.3mg/kgで静脈内bolus投与した場合と、3mg/kgで皮下投与した場合の血清中HGF濃度を測定した。筋肉内投与は、エーテル麻酔下で、ラットの左大腿後部筋肉の中央部に行った。投与容量は1ml/kgとし、0.3m NaCl,0.15 03% Tween80,5mg/ml L-alanineを含む10mMクエン酸緩衝液(pH5.5)をvehicleとして用いた。筋肉内投与では、HGFの投与から5分、30分、2時間、8時間、24時間経過後にラットから血清を採取した。静脈内投与はラットの尾静脈から行い、投与から2分、5分、15分、30分、1時間、2時間、3時間、12時間、24時間経過後に血清を採取した。また、皮下投与では、投与後5分、15分、30分、1時間、2時間、5時間、12時間、24時間に血清を得た。ラット血清中のヒトHGF濃度については、ヒトHGF測定用ELISAキットであるイムニスHGF EIA(特殊免疫研究所製)を用いて測定した。濃度推移の解析にはモーメント解析法を用いた。

(2)結果

25 測定結果を解析して得られた薬物動態パラメータを表 2 に示す。ただし、静脈内 b o l u s 投与については、投与量に対する線形性を仮定し、3 m g / k g の H G F 投 与時のパラメータを算出した。血清中における A U C は、静脈内 b o l u s 投与に比

べて、筋肉内投与、皮下投与で低く、それぞれ静脈内 b o l u s 投与の A U C の 6 7%、2.6%であった。また、最高血清中濃度 (C m a x) についても、静脈内 b o l u s 投与に比べて、筋肉内投与、皮下投与で低く、それぞれ静脈内 b o l u s 投与の C 0 の 0.012%、0.0087%であった。

5

表 2

投与経路	筋肉内	静脈内 bolus	皮下
投与量	3mg/kg	- 3mg/kg	3mg/kg
AUC (min-ng/ml	6310	94390	2419
(infinite)			
t1/2 (min)	801	8.8	525
Cmax or C0	8.96	73380	6.42
(ng/ml)		(Co)	
Tmax	5min	_	5min
AUC ratio	6.7%	_	2.6%
(% i.v.)			·
Cmax ratio	0.012%	_	0.0087%
(% i.v. C0)			, i

3. 投与経路によるHGF筋肉内濃度推移の比較

(1)方法

SD系ラット用いて、HGFを0.01mg/kgで筋肉内投与した場合と、30mg/kgで静脈内bolus投与した場合の筋肉中HGF濃度を測定した。筋肉内投与は、エーテル麻酔下で、ラットの左大腿後部筋肉の中央部に行った。投与容量は0.5ml/kgとし、0.3M NaCl,0.03% Tween80,5mg/ml L-alanineを含む10mMクエン酸緩衝液(pH5.5)をvehicleとして用いた。HGF投与から30分、6時間、24時間経過後、ラットから筋肉(投与部)を得た。静脈内bolus投与はラットの尾静脈から1ml/kgにて行い、投与から5分、30分、1時間、24時間経過後、同様に筋肉を採取した。

筋肉中のヒトHGF濃度については、ヒトHGF測定用ELISAキットであるイムニスHGF EIA(特殊免疫研究所製)を用いて測定した。臓器中のHGFは、2M NaCI、1mM PMSF、1mM EDTA、0.1% Tween80を含有する20mM Tris-HCl(pH7.5)を抽出液として用い(12m1/g tissue)、1分間ホモジナイズした後、<math>4%、15,000rpmで60分間遠心分離し、抽出液中のHGF量を上述のELISAキットにて測定した。その際、スタンダード溶液についても、HGFを投与していないラットの筋肉に既知濃度のHGFを添加し、同様に抽出した溶液を用いた。また、サンプルの希釈液についても、HGFを投与していないラットの筋肉の抽出液を同様に調製して用いた。濃度推移の解析にはモーメント解析法を用いた。

(2)結果

5

10

15

筋肉内ヒトHGF濃度を測定した結果から得られた薬物動態パラメータについて、表3に示す。但し、比較のため、静脈内bolus投与については、投与量に対する線形性を仮定し、0.01mg/kgのHGF投与時のパラメータを算出した。同量のHGF投与を仮定した場合、筋肉中におけるAUCは静脈内bolus投与に比べて、筋肉内投与(投与部)で著しく高く、静脈内bolus投与の約650倍であった。また、最高筋肉中濃度(Сmax)についても、静脈内bolus投与に比べて、筋肉内投与(投与部)で著しく高く、静脈内bolus投与の約960倍であった。

表3

	筋肉内(im)	静脈内bolus (iv)	im/iv
AUC	4160	6.37	650
(ng·hr/g muscle)			
Cmax	459	0.476	960
(ng/g muscle)	<u></u>		

20

実施例 2

ラット下肢虚血ASOモデルに対する筋肉内投与の薬効検討

(1)方法

SD系ラット(9週齢、雄)を用いた。約50mg/kgのペントバルビタール(ダイナボット社製、ネンプタール)を腹腔内投与し、ラットを麻酔した。分枝を結紮した後、左大腿動脈を摘出し、ラット下肢虚血モデルを作成した。ラットをエーテルにより麻酔し、左大腿部内側の筋肉内にHGFまたはvehicleを投与した。大腿動脈摘出直後から投与を開始し、投与量lmg/kg/day、投与容量lml/kg/day、1日1回、5日間投与した。vehicleとして0.3M NaCl,0.03% Tween80,5mg/ml alanine,10mM Na-citrate buffer(pH5.5)を用いた。大腿動脈摘出から14日後に、ペントバルビタールによりラットを麻酔し、下肢周辺の毛を除毛クリームにて除毛した後、サーモグラフィー(日本アビオニクス社製)を用いて、大腿下部内側(図5の部位1)・下腿部内側(同部位2)・膝下外側(同部位3)・下腿前部外側(同部位4)・大腿下部外側(同部位5)・下腿部外側(同部位6)の6ヶ所の皮膚表面温度を、両下肢同時に測定した。それぞれの測定部位について、虚血肢温度から正常肢温度を引き、皮膚表面温度の差を算出した。

15 (2)結果

5

10

20

虚血肢と正常肢の皮膚表面温度の差を図5に示す。即ち、大腿動脈を摘出し、 $vehote{e}$ hicleを投与した群(図中、白)では、虚血肢の各部位において、正常肢と比べて $0.8\sim1.7$ ∞ の温度低下が見られた。それに対して、HGFを投与した群(図中、黒)においては、 $0.2\sim1.0$ ∞ の温度低下に抑えられていた。各部位毎に、温度低下を2 群間で比較したところ、6 ∞ 所全ての部位において、HGF投与群の方が温度低下が小さい傾向が見られた。また、下腿部内側および大腿下部外側の2 ∞ においては、HGFの投与により有意に温度低下が抑制された。

以上の図5から示されるように、ラット下肢虚血モデルを作製し、虚血肢の大腿部筋肉内にHGFを投与したところ、虚血肢における皮膚表面温度の低下が抑制された。 25 これは、HGFが持つ血管新生作用により、虚血肢における血行動態が改善され、温度の低下が抑制されたと考えられる。

実施例3

10

25

HGF含有ミニペレットからのin vitro HGF放出におけるコンドロイチン硫酸の影響

- (1)アラニン10%含有のHGF含有ミニペレットの調製法
- 5 HGF含有量: 131. 2μg/mgミニペレット

(2)コンドロイチン硫酸 1 0 %含有のHGF含有ミニペレットの調製法 HGF含有量: 1 3 2. 8 μg/mgミニペレット

HGF 6 5. 3 mgを含有する水溶液 6. 9 m l と 1. 5 % コンドロイチン硫酸ナ トリウム水溶液 2. 9 m l と蒸留水 1 7 m l および 2 % アテロコラーゲン 1 6. 7 g を混合し、凍結乾燥した後、少量の蒸留水を加えて膨潤させ、練合し、均質な混合液にした。これを 1 0 m l のディスポーザブルシリンジに入れ、 1 0, 0 0 0 G で 6 0 分間遠心脱泡した。これをシリンジから押し出した後、乾燥し、切断することにより一本あたり 5 0 0 μ g の H G F を含有する棒状の ミニペレット(直径 0. 9 m m、 長 20 さ 4 m m)を得た。

- (3) in vitro放出試験
- 0.3% Tween20を含むPBS(pH7.4)を放出液として用いた。37%において、2mlの放出液中に上述の方法で調製したミニペレットを各々入れ、HGFの放出速度を測定した(n=2)。放出液中のHGF濃度については、 \sim パリンアフィニティークロマトグラフ法にて測定した。

実験結果を図6に示す。即ち、コンドロイチン硫酸含有のミニペレットからは、1日後にはほぼ100%のHGFが放出されたのに対し、コンドロイチン硫酸を含有しな

いアラニン含有ミニペレットからは緩やかにHGFが放出された。放出開始から7日後においても放出されたHGF量はミニペレット含有量の30%未満に留まった。これは、HGFと親和性を持つコンドロイチン硫酸などのプロテオグリカンとHGFを共存させる事により、HGFの放出を促進させ得る事を示す。また逆に、コンドロイチン硫酸などのプロテオグリカンを共存させない事により、放出を緩やかにし、投与部位に局所的にHGFを作用させ得る可能性を示す。

実施例4

ラット筋肉内HGF投与後の各臓器における c - Me t のリン酸化

10 (1)方法

5

15

20

25

SD系ラット(12週齢、雄)を用いて、筋肉内投与後の筋肉、肝臓、腎臓におけ る c-Metのリン酸化について検討した。エーテル麻酔下でラットの左大腿後部筋 肉内に3、0.3、0.03mg/kgのHGFを投与した。投与から5分、30分 後にラットを脱血し、筋肉、肝臓、腎臓を摘出した。摘出した臓器にRIPA bu ffer(50mM Tris-HCl(pH7. 4), 50mM NaCl, 1% T ritonX-100, 5mM EDTA, 10mM Na₄P₂O₇, 50mM Na F, 1mM Na $_3$ VO $_4$, 0. 4mM AEBSF, 10 μ g/ml Leupept in, $1.0 \,\mu\,\text{g/ml}$ Aprotinin, $1\,\mu\,\text{g/ml}$ PepstatinA) を5 (筋肉) または8 (肝臓、腎臓) ml/g tissue添加し、ポリトロンを 用いてホモジネートした。そして、16000rpm、4℃、30分間遠心分離する ことにより沈殿を除いた。10mg(筋肉)または5mg(肝臓、腎臓)の蛋白を含 む抽出液をRIPA bufferで1mlとし、50μl(約50%)のProt ein G Sepharose (Pharmacia社) を加え、4℃で、2時間 攪拌した。遠心により、Protein G Sepharoseを除き、その上清 に1μgの抗c-Met抗体(Santa Cruz社)を加え、4℃で一晩攪拌し た。さらに、20μlのProtein G Sepharoseを加え、4℃で2 時間攪拌した。遠心により上清を除き、Protein G Sepharoseを1 5

10

15

20

25

mlのRIPA bufferで3回洗浄した後、 2×1 oading bufferを加え、100 ℃、5 分間加熱し、7.5% SDS-PAGEに供した。泳動した蛋白は二トロセルロースフィルター上に電気的に転写、結合させた。フィルターは、3% BSAを含むTBS-T $(10\,\mathrm{mM}\ \mathrm{Tris}-\mathrm{HCI}(\mathrm{pH7.6})$, $150\,\mathrm{m}\ \mathrm{M}\ \mathrm{NaCl}$, 0.05% Tween 20) 中で振とうすることにより、ブロッキングした。TBS-Tで軽く洗浄後、 $1\,\mu\,\mathrm{g/m}\,\mathrm{I}\,\mathrm{o}$ 抗リン酸化チロシン抗体($\mathrm{Up}\ \mathrm{state}\ \mathrm{Biotechnology}$ 社)を含むTBS-T中で、室温、1時間振とうした。さらにTBS-Tで洗浄後、 $2000\,\mathrm{e}$ 希釈したペルオキシダーゼ標識抗マウスI g抗体($\mathrm{Amersham}$ は)を含むTBS-T中で、室温、 $\mathrm{1}$ 時間振とうした。TBS-Tで洗浄後、 $\mathrm{ECL}\,\mathrm{D}$ エスタンブロット検出試薬($\mathrm{Amersham}$ 社)を用いて、リン酸化された $\mathrm{c-Met}\,\mathrm{o}$ 使出を行った。

フィルターは、62.5 mM Tris-HCl(pH6.7), 100 mM 2-mercaptoethanol, 2% SDS溶液中で、60 $^{\circ}$ 、30分間振とうすることにより、デプローブし、TBS-Tで洗浄後、3% BSAを含むTBS-T中で振とうすることにより、ブロッキングした。TBS-Tで軽く洗浄後、0.5 μ g/mlの抗c-Met抗体を含むTBS-T中で、室温、1時間振とうした。さらにTBS-Tで洗浄後、2000倍希釈したペルオキシダーゼ標識抗ウサギIg抗体(Amersham社)を含むTBS-T中で、室温、1時間振とうした。TBS-Tで洗浄後、ECLウエスタンブロット検出試薬を用いて、c-Metの検出を行った。

(2)結果

リン酸化c-Metに対するIP-Westernの結果を図7に示す。筋肉組織では、 $0.03\sim3$ mg/k gの各投与量において、c-Metの著しいリン酸化が見られた。一方、肝臓および腎臓においては、HGF筋肉内投与によるc-Metのリン酸化は見られなかった。この事は、3 mg/k g以下のHGFを筋肉内に投与する事により、肝臓・腎臓に作用させる事無く、筋肉組織・筋肉組織中の血管に選択的にHGFを作用させ得る事を示している。

実施例5

ラット下肢虚血ASOモデルに対する筋肉内投与の薬効検討(1)

(1)方法

5 SD系ラット (14週齢、雄)を用いた。約50mg/kgのペントバルビタール(ダイナボット社製、ネンブタール)を腹腔内投与し、ラットを麻酔した。分枝を結紮した後、左大腿動脈を摘出し、ラット下肢虚血モデルを作成した(Cardiovascular Research, 35, 547-552 (1997)参照)。その直後に、左大腿部の筋肉内にHGFまたはvehicleを投与した。投与量は100μg/kg、投与容量はlml/kgとした。さらに4日後、エーテル麻酔下で同様に投与を行った。vehicleとして0.3M NaCl, 0.03% Tween80,5mg/ml alanine,10mM Na-citrate buffer(pH5.5)を用いた。大腿動脈摘出から14日後に、ペントバルビタールによりラットを麻酔し、実験動物用非観血式血圧計を用いて下肢血圧を測定した。正常肢、虚血肢それぞれの血圧から1/N比(%)=虚血肢血圧/正常肢血圧×100を計算し、評価を行った。

(2)結果

結果を図8に示す。HGF投与群では、vehicle 投与群に比べ有意にI/N比が改善された。これは、HGFが持つ血管新生作用によるものと考えられた。

20

実施例 6

ウサギ下肢虚血ASOモデルに対する筋肉内投与の薬効検討

(1)方法

N Z W 系 ウサギ (2 2 週齢、雄)を用いた。5 m g / k g のキシラジン (バイエル 25 株式会社製、セラクタール) および 5 0 m g / k g のケタミン (三共株式会社製、ケタラール)を上腕部筋肉内に投与し、ウサギを麻酔した。左大腿部を切開し、左大腿動脈を摘出することにより、ウサギ下肢虚血モデルを作成した (J. Clin. In

5

10

15

vest., 93, 662-670 (1994) 参照)。その10日後および15日 後に、同様に麻酔を行い、左大腿部の筋肉内にHGFまたはvehicleを投与し た。投与量は100μg/kg、投与容量はlml/kgとした。vehicleとし τ 0. 3M NaCl, 0. 03% Tween 80, 5 mg/ml alanin e, 10mM Na-citrate buffer (pH5.5)を用いた。大腿 動脈摘出から10日後(薬液投与前)、22日後、および42日後に、上記方法によ りウサギを麻酔し、ドップラー血流計(Triton社製)と水銀血圧計を用いて両 下肢の血圧を測定した。正常肢、虚血肢それぞれの血圧から I / N比(%) = 虚血肢 血圧/正常肢血圧×100を計算し、評価を行った。10日後からのI/N比の増加 率についても算出し、評価した。また、動脈摘出から10日後および最終日(41ま たは42日後)に、造影剤(山之内製薬株式会社製、オプチレイ350)を用いて左 下肢選択的に血管造影を行った。得られた血管造影写真に、直径2.5mmの円を並 べたシートを重ね、血管と重なっている円の数をカウントし、円の全数(800個) に対する割合を算出し、血管造影スコアとした。各ウサギの血管摘出10日後の血管 造影スコアから最終日の血管造影スコアへの増加率 (%) を計算し、血管造影スコア 増加率として評価した。最終日に、虚血肢関節の硬化度、虚血肢爪先の壊死・脱落、 虚血肢下腿部の潰瘍について観察した。

(2)結果

下肢血圧のI/N比の推移を図9に示す。動脈摘出22日後から、HGF投与群で20 高値の傾向を示し、42日後において、HGF投与群では、vehicle投与群に比べ有意にI/N比が改善された。これは、HGFが持つ血管新生作用により、虚血肢の血行動態が改善したものと考えられた。また、下肢血圧のI/N比の増加率を図10に示す。動脈摘出10日後から42日後までのI/N比の増加率は、vehicle群と比較してHGF投与群で有意に高かった。血管造影スコアの増加率を図11に示す。vehicle投与群に比べて、HGF投与群の方が有意に増加率が高く、HGFの作用により側副血行路の発達が促進されたものと考えられた。評価最終日の虚血肢の観察においても、HGF投与群の方が、vehicle投与群と比較して症

状が軽い傾向が認められ(表 4)、HGF投与による虚血肢の血行動態の改善を反映 していると思われた。

表4

群	下肢関節の硬化			爪先の壊死・脱落	虚血肢の潰瘍
	なし	軽度	重度		
vehicle(n=8)	4	1	3	1 .	3
HGF(n=8)	6	2	0	0	0

5

10

15

20

実施例7

ラット下肢虚血ASOモデルに対する筋肉内投与の薬効検討(2)

(1)方法

SD系ラット(14週齢、雄)を用いた。約50mg/kgのペントバルビタール(ダイナボット社製、ネンブタール)を腹腔内投与し、ラットを麻酔した。分枝を結紮した後、左大腿動脈を摘出し、ラット下肢虚血モデルを作製した(Cardiovascular Research、35、547-552(1997)参照)。その直後に、左大腿部の筋肉内にHGFまたはvehicleを投与した。投与量は1 μ g/kgとし、投与容量はすべての実験でlml/kgとした。さらに4日後、エーテル麻酔下で同様に2回目の投与を行った。vehicleとして0.3M NaCl、0.03% Tween80、5mg/ml alanine、10mM Na-citrate buffer(pH5.5)を用いた。大腿動脈摘出から7日後に、ペントバルビタールによりラットを麻酔し、実験動物用非観血式血圧計を用いて下肢血圧を測定した。正常肢、虚血肢それぞれの血圧からl/N比=虚血肢血圧/正常肢血圧を計算し、評価を行った。

また、単回投与における効果を調べるため、大腿動脈摘出当日のみに投与を行い、同様の実験を行った。 HGF の投与量は $3~\mu~\mathrm{g/k}$ g とした。

(2)結果

2回投与による結果を図12に示した。大腿動脈摘出7日後において、HGF投与

群では、vehicle投与群に比べ有意にI/N比が改善された。これは、HGFが持つ血管新生作用によるものと考えられた。 $HGFは1\mug/kgX2$ 回という低用量で効果があることが示された。

また、単回投与による結果を図13に示した。大腿動脈摘出7日後において、HG 5 F投与群では、vehicle投与群に比べ有意にI/N比が改善された。HGFは 単回投与でも効果があることが示された。

製剤例1

生理食塩水100ml中にHGFlmg、マンニトール1g及びポリソルベート8 10 0 10mgを含む溶液を無菌的に調製し、1mlずつバイアルに分注した後、凍結 乾燥して密封することにより凍結乾燥製剤を得た。

製剤例2

0.02Mリン酸緩衝液(0.15M NaCl及び0.01%ポリソルベート80 15 含有、pH7.4)100ml中にHGF1mg及びヒト血清アルブミン100mg を含む水溶液を無菌的に調製し、1mlずつバイアルに分注した後、凍結乾燥して密 封することにより凍結乾燥製剤を得た。

産業上の利用可能性

20 本発明により、HGFを有効成分として含有し、虚血性疾患あるいは動脈疾患を治療又は予防するための投与用製剤が提供される。本発明の筋肉内投与用製剤は、静脈内投与と比較して半減期が長く、筋肉内に維持されやすいことから、従来の静注等と比較して投与量が低減でき、また患部以外への作用が少ないという効果を有する。

20

請求の範囲

- 1. 肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分とし、投与部位局所の組織及びその近 5 傍組織に有効量の該因子を移行・分布・作用させ、且つ、投与部位以外の血液中及び 全身の組織への移行・分布・作用を低減できる製剤。
 - 2. 虚血性疾患又は動脈疾患を治療又は予防するための、請求項1記載の製剤。
 - 3. 投与部位が筋肉である、請求項1又は2記載の筋肉内投与用製剤。
- 4. 投与部位が皮下又は表皮である、請求項1又は2記載の皮下投与用製剤、外用剤 10 又はハップ剤。
 - 5. 投与部位が骨格筋又は心筋である、請求項3記載の筋肉内投与用製剤。
 - 6. 投与部位である筋肉組織への移行・分布・作用が、血液、肝臓及び腎臓への移行・分布・作用を凌駕することを特徴とする、請求項1、2、3又は5記載の製剤。
- 7. 肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分として含有する製剤の同量を静脈内へ 15 ボーラス投与した時と比較し、血液、肝臓及び腎臓における最大濃度が100分の1 以下であり、投与部位である筋肉組織内濃度が50倍以上であることを特徴とする、 請求項1、2、3、5又は6記載の筋肉内投与用製剤。
 - 8. 肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分として含有する製剤の同量を静脈内へボーラス投与した時と比較し、血液、肝臓及び腎臓におけるAUCが5分の1以下であり、投与部位である筋肉組織内AUCが50倍以上であることを特徴とする、請求項1、2、3、5又は6記載の筋肉内投与用製剤。
 - 9. 心臓または四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療又は予防するための、請求項1、2、3、5、6、7又は8記載の筋肉内投与用製剤。
- 10 心臓または四肢の虚血性疾患または動脈疾患を治療又は予防するための投与部 位が患部及びその周辺の筋肉局所である、請求項 9 記載の筋肉内投与用製剤。
 - 11. 1回の投与量が0. 01~500 μ g/kgであることを特徴とする、請求項1、2、3、5、6、7、8、9又は10記載の筋肉内投与用製剤。

- 12 1回の投与量が $0.1\sim10\mu$ g/kgであることを特徴とする、請求項11記載の筋肉内投与用製剤。
- 13. 動脈疾患が閉塞性動脈硬化症である、請求項1~12いずれか記載の製剤。
- 14. 虚血性疾患が虚血性心疾患である、請求項1~12いずれか記載の製剤。
- 5 15. 肝実質細胞増殖因子(HGF)を有効成分として含有し、且つ、HGFを結合
 - ・吸着する物質を含有しないことを特徴とする、請求項1~14いずれか記載の製剤。

図 1




図 2




図 3




図 4




図 5.






図 6



ŝ

図 7



A:筋肉、B:腎臓、C:肝臓

1:無処置、2:0.03mg/kg HGF投与5分後、3:0.03mg/kg HGF投与30分後 4:0.3mg/kg HGF投与5分後、5:0.3mg/kg HGF投与30分後 6:3mg/kg HGF投与5分後、7:3mg/kg HGF投与30分後

PY: 抗リン酸化Tyr抗体によるblotting c-Met:抗c-Met抗体によるblotting 矢印は、c-Metの位置を示す。

図 8




図 9




図 1 0




図 1 1




図12





図 1 3



国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP99/04249 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl 6 A61K38/18 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁶ A61K38/18 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 X 高広 等、 「慢性虚血心筋に対するレーザー心筋内欠陥新生 1 - 15術におけるHepatocyte Growth Factor併用効果の検討」、Japanese Circulation Journal, Feb 1998, Vol. 62, Supplement I, p. 407, P089 X JP, 7-300426, A (雪印乳業株式会社) 14.11月. 1995 (14.11.95) 特許請求の範囲、【0008】、 1 - 15[0009], [0013] &WO, 95/29694, A1&EP, 784980, A1 &US, 5840311, A 区欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 08.11.99 16.11.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 C 9284 日本国特許庁(ISA/JP) 瀬下 浩-

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国贸	語	查報	告
----	---	----	---

国際出願番号 PCT/JP99/04249

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
X	JP, 8-295634, A (住友製薬株式会社) 12. 11月. 1996 (12. 11. 96) 特許請求の範囲、【0011】 ファミリーなし	請求の範囲の番号 1-15
X Y	JP, 5-97694, A(電気化学工業株式会社)20.4月. 1993(20.04.93)【請求項3】、【0010】、 【0036】 ファミリーなし	1-8, 11, 12, 15 9, 10, 13, 14
X Y	WO, 93/03061, A1 (東レ株式会社) 18. 2月. 1993 (18. 02. 93) 請求の範囲、第29ページ第19行 -第30ページ第3行 &EP, 550769, A1	1-8, 11, 12, 15 9, 10, 13, 14
X Y	JP, 6-340546, A (中村 敏一) 13. 12月. 1994 (13. 12. 94) 特許請求の範囲、【0012】 &WO, 93/08821, A1&EP, 724884, A1	1-8, 11, 12, 15 9, 10, 13, 14
Y	Van BELLE, Eric et al, Potentiated Angiogenic Effect of Scatter Factor/Hepatocyte Growth Factor via Induction of Vascular Endothelial Growth Factor, Circulation, May 1998, Vol. 97, No. 4, pp. 381-390, Abstract, Discussion	9, 10, 13, 14
	-	
	. •	